

MAMYPROL

Liquide prêt à l'emploi à usage exclusivement professionnel

HYGIENE DE LA MAMELLE

TREMPAGE OU PULVERISATION DES TRAYONS APRES LA

TRAITE

PRODUIT BIOCIDES - N° Inventaire Ministère de l'Ecologie : 26159

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Acide D-gluconique, composé avec N,N"-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanediamidine (2:1) 0,415g +N-acétyl-N-butyl-.beta.-alaninate d'éthyle 0,1g

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 3 : Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire; GROUPE 3: Produits antiparasitaires; Type de produits 19 : Répulsifs et appâts

PRESENTATION

- . Liquide limpide, Rouge
- . pH pur : $5,5 \pm 0,5$
- . pH à 10 g/l : Non disponible
- . Masse volumique à 20° C : $1,01 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$
- . Point de gel : 0 °C

PROPRIETES

- . Composants essentiels:
 - Digluconate de chlorhexidine : 4 400 mg/l
 - Adoucissants et emollients: lanoline, glycérine
 - Répulsif insectes

- Agents filmogènes
- Tensio-actif
- Stabilisant
- Colorant

AVANTAGES :

Contient une molécule désinfectante.

1) ACTION REMANENTE

La chlorhexidine garantit une protection contre la contamination par des germes pathogènes entre les traites.

Grâce à la chlorhexidine qui conserve ses propriétés, MAMYPROL reste actif, même en présence de résidus de lait ou de matières grasses.

2) FILMOGENE :

MAMYPROL est conçu pour former un film protecteur sur l'ensemble de la mamelle, et en particulier au niveau de l'orifice des trayons, ce qui assure une protection élevée et durable.

3) ADOUCISSANT, HYDRATANT :

MAMYPROL, qui contient deux principes adoucissants (lanoline, glycérine) a des propriétés émollientes et hydratantes. MAMYPROL adoucit l'épiderme du pis et l'empêche de se dessécher.

4) REPULSIF INSECTES :

MAMYPROL contient un insectifuge

5) INNOCUITE :

MAMYPROL est dépourvu de toute toxicité locale dans les conditions normales d'utilisation.

6) TENSIO-ACTIF :

Les agents de surface contenus dans MAMYPROL facilitent :

- son contact avec tout le trayon; MAMYPROL agit dans les infractuosités, là où les germes sont présents. Son action de protection est ainsi maximum.
- la nébulisation de MAMYPROL en un fin brouillard, lorsqu'on l'utilise en pulvérisation.
- le lavage de la mamelle avant la traite suivante

APPLICATION

- . MAMYPROL est prêt à l'emploi
- . MAMYPROL doit être utilisé après chaque traite, avant que le sphincter du trayon ne se referme, pour décontaminer et protéger le trayon.

Mode d'emploi:

MAMYPROL est prêt à l'emploi

Immédiatement après chaque traite, faire une application de MAMYPROL PUR,

-soit par trempage :

remplir le gobelet de trempage et immerger durant quelques secondes chaque trayon

-soit par pulvérisation :

MAMYPROL peut être utilisé par tous les appareils destinés à la pulvérisation des trayons

Solution à base de CHLORHEXIDINE et de substances adoucissantes (GLYCERINE, LANOLINE)

Usage animal seulement.

Usage externe seulement.

Produit : MAMYPROL _____

Date de MAJ : 04/09/19

version 1.11

Code : 07010

CONDITIONNEMENT

Jerrican 0,5l 0,5kg

Jerrican 10l Neutre 10kg

Jerrican 22l Neutre 21kg

Tonnelet carré 60l Bleu foncé 60kg

Fût 220l Bleu foncé 220kg

GRV 1000l Couleur naturelle 1000kg

Utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication.

Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources de chaleur et de lumière intense.

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : <http://www.kersia-group.com>

. Comme tous les produits à base de chlorhexidine, MAMYPROL doit être stocké à l'abri de la lumière et de la chaleur (température < 30°C).

LEGISLATION

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.